

Information aux usagers : Le DSRC OncoPaca-Corse décline sa responsabilité concernant les contenus publiés sur d'autres sites web prétendant être liés à notre structure ou utilisant sans autorisation, en tout ou partie, nos dénominations, noms de domaine et marques "OncoPaca" et "OncoPaca-Corse".



Bulletin de Sante Publique Provence Alpes Côte d'Azur - Tabac

Thématique:

Santé publique - épidémiologie

Profil:

Acteurs de Santé de Ville

Médical - Oncologie

Paramédical

Mot(s) clef(s):

Rapports et expertises scientifiques

Illustration en remplacement:

SOMMAIRE

Édito p.1 Points clés p.1 Comparaisons régionales du tabagisme en France p.2 Le tabagisme dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur p.6 Morbidité et mortalité associées au tabac dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur p.10 Les actions de prévention du tabagisme dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur p.16 Sources des données p.19 Définition des variables p.20 Effectifs régionaux p.21 Bibliographie p.22

ÉDITO

Un million : c'est le nombre de fumeurs quotidiens en moins en 2017. C'est une grande victoire pour la lutte contre le tabagisme. Et pourtant, les acteurs publics sont tous pleinement conscients qu'il faut aller encore plus loin, repousser les limites de nos connaissances sur ce sujet, nous impliquer encore davantage dans la prévention, comprendre, agir. Car la lutte contre le tabagisme est une priorité absolue de santé publique : le tabagisme reste malgré tout la première cause de mortalité évitable, la première cause de cancer, la deuxième cause de maladies cardio-vasculaires. Il brise encore chaque jour des centaines de vies et pèse sur notre système de solidarité : chaque année, les seules dépenses de santé induites par le tabac coûtent à la collectivité 26 milliards d'euros. Le bulletin que vous vous apprêtez à lire est un éclairage précieux sur les perceptions et comportements des fumeurs : il nous permettra de repenser nos programmes, d'ajuster nos politiques en matière de lutte contre le tabac.

Car d'importantes inégalités régionales sont observées : la région Paca est à la fois la plus touchée par la prévalence du tabac et celle dans laquelle la baisse n'est pas significative. Elle se distingue par des inégalités sociales et de santé particulièrement marquées, et par des consommations d'autres substances psychoactives supérieures au niveau national.

Il faudra donc poursuivre les efforts engagés, aussi bien pour accompagner les fumeurs qui souhaitent arrêter avec l'opération du Moi(s) sans tabac, que pour mobiliser un grand nombre d'acteurs, institutionnels, professionnels de santé, société civile, au plus proche de la population. Cet engagement, l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur le porte, avec l'inscription du parcours santé et addictions en priorité du Projet régional de santé, et la mise en œuvre du programme régional de réduction du tabagisme.

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur

POINTS CLÉS

- En 2017 :
 - la prévalence standardisée du tabagisme quotidien en Paca s'élevait à 32,2% parmi les 18-75 ans et était significativement plus élevée que la moyenne nationale (26,9%, France métropolitaine).
 - la prévalence du tabagisme quotidien en Paca parmi les 18-75 ans était stable comparé à 2016 tandis qu'elle baissait au niveau national.
 - la prévalence du tabagisme quotidien en Paca chez les jeunes de 17 ans était de 26%, proche de la moyenne française.
 - la proportion de personnes déclarant vapoter quotidiennement en Paca était de 3,5%, proche de la moyenne française.
 - 57,8% [52,1-62,6] des fumeurs quotidiens déclaraient avoir envie d'arrêter de fumer. Parmi les fumeurs quotidiens, 28,2% [23,6-33,5] avaient fait une tentative d'arrêt d'au moins une semaine au cours des 12 derniers mois (contre 26,3% [25,0-27,7] en France métropolitaine, p=0,40).
- En Paca pour la période 2007-2016, le taux annuel standardisé d'incidence pour 100 000 personnes-années du cancer du poumon était de 19,4 chez les femmes (significativement plus élevée que la moyenne nationale) et 50,8 chez les hommes (non différent de la moyenne nationale).
- En Paca pour la période 2007-2014, le taux annuel standardisé de mortalité pour 100 000 personnes-années par cancer du poumon était de 11,2 chez les femmes (significativement plus élevée que la moyenne nationale) et 36,6 chez les hommes (significativement plus faible que la moyenne nationale).
- Les actions clés en prévention du tabagisme en 2018 :
 - Le plan régional de réduction du tabagisme (P2RT), une stratégie globale, évolutive et fédératrice, centrée autour de 3 priorités : protéger les jeunes et éviter l'entrée dans le tabac, aider les fumeurs à s'arrêter et réduire les inégalités de santé.
 - Un appel à projets annuel avec 17 projets retenus pour 1,8M€ et notamment des établissements sanitaires à accompagner dans une démarche « Lieux de santé sans tabac ».
 - Le RDV annuel « Moi(s) sans tabac », un succès pour l'édition 2017, avec une augmentation de 57% du nombre de participants.

Date de mise en ligne:

Jeudi, janvier 31, 2019

Date de fin de mise en ligne :

Samedi, février 7, 2026

Fichier:

 bulletin_sante_publique_tabac_paca_01-2019.pdf

Date de parution:

Jeudi, janvier 31, 2019