

Information aux usagers : Le DSRC OncoPaca-Corse décline sa responsabilité concernant les contenus publiés sur d'autres sites web prétendant être liés à notre structure ou utilisant sans autorisation, en tout ou partie, nos dénominations, noms de domaine et marques "OncoPaca" et "OncoPaca-Corse".



FBP Imatinib - Suivi des patients sous thérapie orale en OncoHématologie

Thématique:

Onco-Hématologie

Pathologie:

Hématologie

Auteur:

OncoPaca-Corse, Dispositif Spécifique Régional du Cancer

Type de document:

Fiches et documents pour la pratique

Profil:

Acteurs de Santé de Ville

Médical - Oncologie

Paramédical

Mot(s) clef(s):

Fiches et documents pratiques (Pro)

Sous-titre du document:

Fiche de Bonnes Pratiques

Illustration en remplacement:

Onco-hématologue / équipe référente

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
DE 1^{er} RECOURS
FICHE DE BONNES PRATIQUES



Les professionnels de 1^{er} recours trouveront dans cette fiche une aide au dépistage précoce des effets indésirables potentiels (EI), des propositions de gestion de ces EI, et les principales interactions médicamenteuses à prendre en compte.

ATTENTION : Cette fiche est un outil d'aide à la pratique mis à disposition à titre indicatif. Elle ne remplace en aucun cas un avis médical ou/et pharmaceutique spécialisé.

I Informations générales

- **Mode d'action :** inhibiteur de tyrosine kinase ciblant BCR-ABL.
- Posologie établie par le médecin prescripteur : **ne jamais arrêter le traitement ni modifier le rythme d'administration sans avis du prescripteur.**
- Médicament à prendre avec un grand verre d'eau, de préférence avec un aliment, ou au cours des repas (atténue les effets indésirables digestifs) ; si 1 prise par jour, éviter la prise le soir en cas de gastralgies.
- Les comprimés peuvent être dispersés dans un verre d'eau plate ou de jus de pomme.
- Si une dose a été oubliée, prendre la dose si retard < à 12h (ou < à 6h si 2 prises par jour) ; si retard supérieur, la dose oubliée ne doit pas être prise ; le traitement doit être continué selon la posologie habituelle.

Les patients devront être informés de possibles effets indésirables tels que sensations vertigineuses, troubles visuels ou somnolence au cours du traitement par l'imatinib. **La prudence est donc recommandée pour les utilisateurs de véhicules ou de machines.**

II Surveillance particulière

II SURVEILLANCE CLINIQUE

- Prise de tension hebdomadaire le 1^{er} mois puis régulière.

II SURVEILLANCE BIOLOGIQUE

- **HÉMOGRAMME :**
1 fois/semaine le 1^{er} mois,
1 fois/15 jours les 2^{ème} et 3^{ème} mois,
1 fois/3 mois ensuite
- **BILAN HÉPATIQUE** (transaminases, bilirubine, phosphatases alcalines) **ET RÉNAL** (créatinine, attention particulière aux patients avec facteurs de risque d'altération de la fonction rénale).

II SURVEILLANCE RENFORCÉE

- **SI INSUFFISANCE CARDIAQUE** (risque d'aggravation des effets hydrosodiques).
- **SI DIABÈTE :** dosage régulier de la glycémie (risque d'hypoglycémie).
- **VHB :** Tous les patients doivent faire l'objet d'un **dépistage** d'une infection par le VHB avant l'initiation d'un traitement par dasatinib, puis faire l'objet d'une **surveillance sérologique VHB régulière**. Les patients porteurs du VHB et traités par dasatinib doivent être **étroitement surveillés** tout au long du traitement et plusieurs mois après son arrêt. (Cf alerte ANSM: <https://ansm.sante.fr/>)

VACCINATIONS : les vaccinations prophylactiques sont décidées par l'onco-hématologue référent.



Pour plus d'informations sur les soins de support, consulter les sites oncopaca.corse.org et prosilif.osc.aicr.org

Date de mise en ligne:

Mercredi, septembre 15, 2021

Fichier:

[imatinitb-fbp-oncohemato-oncopacacorse-2021.pdf](#)

Date de parution:

Mercredi, septembre 15, 2021