Information aux usagers : Le DSRC OncoPaca-Corse décline sa responsabilité concernant les contenus publiés sur d'autres sites web prétendant être liés à notre structure ou utilisant sans autorisation, en tout ou partie, nos dénominations, noms de domaine et marques "OncoPaca" et "OncoPaca-Corse".

FBP Ruxolitinib - Suivi des patients sous thérapie orale en OncoHématologie

Thématique:
Onco-Hématologie
Pathologie:
Hématologie
Auteur:
OncoPaca-Corse, Dispositif Spécifique Régional du Cancer
Type de document:
Fiches et documents pour la pratique
Profil:
Acteurs de Santé de Ville
Médical - Oncologie
Paramédical
Mot(s) clef(s):
Fiches et documents pratiques (Pro)
Sous-titre du document:
Fiche de Bonnes Pratiques
Illustration en remplacement:

Groupe de travail régional SUD Paca Corse ONCO-HEMATOLOGIE

Suivi des patients sous thérapie orale en onco-hématologie : RUXOLITINIB

PROFESSIONNELS DE SANTÉ DE 1ER RECOURS

FICHE DE BONNES PRATIQUES

Onco-hématologue / équipe référente

. . . . . .

. . . . . .

Les professionnels de 1er recours trouveront dans cette fiche une aide au dépistage précoce des effets indésirables potentiels (EI), des propositions de gestion de ces EI, et les principales interactions médicamenteuses à prendre en compte.

ATTENTION : Cette fiche est un outil d'aide à la pratique mis à disposition à titre indicatif. Elle ne remplace en aucun cas un avis médical ou/et pharmaceutique spécialisé.

I Informations générales

- **Mode d'action :** inhibiteur de tyrosine kinase ciblant JAK.
- Posologie adaptée par le médecin prescripteur - Ne jamais arrêter le traitement ni modifier le rythme d'administration sans l'avis du prescripteur.
- Prise par voie orale, si possible pendant les repas (peut atténuer les effets indésirables digestifs), approximativement à la même heure.
- Si une prise a été oubliée, ou en cas de vomissement, ne pas prendre une nouvelle dose, mais attendre la prochaine prise selon la prescription habituelle.

II Surveillance particulière

SURVEILLANCE CLINIQUE

- Poids (prise rapide de poids évocatrice de rétention hydrique).
- En cas d'arrêt du traitement : effet rebond (les symptômes liés à la maladie peuvent réapparaître sur une période d'environ 1 semaine).

SURVEILLANCE BIOLOGIQUE

- **HÉMOGRAMME :**
  1 fois/semaine le 1er mois,
  1 fois/15 jours les 2ème et 3ème mois,
  1 fois/3 mois ensuite.
- **BILAN LIPIDIQUE RÉGULIER** recherche éventuelle dyslipidémie.
- **KALIÉMIE** (en cas de diarrhée sévère).
  Prise de poids : rétention hydrique, contrôle régulier lipidémie.
- **CONTRÔLE ALAT/ASAT** (hépatotoxicité fréquente) :
  si > 5N, contrôle à 72H, et si > 5N et hyperbilirubinémie :
  Appel onco-hématologue pour avis.

SURVEILLANCE RENFORCÉE

- **SI PATHOLOGIE HEPATIQUE** (élimination hépatique), **RENALE ou CARDIAQUE** : possible majoration de l'atteinte rénale ou des effets cardio-vasculaires.
- **SI ÂGE > 60 ANS** (risque de majoration des effets indésirables graves, notamment cardiaques) (cf ; alerte ANSM toxicité cardiovasculaire : www.ansm.santé.fr).

L'état des patients porteurs d'une insuffisance cardiaque peut s'aggraver sous ruxolitinib du fait de ses effets métaboliques : la surveillance cardiaque doit être renforcée chez ces patients. Attention aux effets de l'anémie et de la diarrhée.

VACCINATIONS : les vaccinations prophylactiques sont décidées par l'onco-hématologue référent.

Pour plus d'informations sur les soins de support, consulter les sites oncopacacorse.org et prosinfoscancer.org

© ORS Onco Paca Corse 2021 - FBP Onco-hématologie - ruxolitinib - 01/1 - Source : www.oncopacacorse.org/professionnels/fiches-bonnes-pratiques/ - Ne pas jeter sur la voie publique

Date de mise en ligne:
Mercredi, septembre 15, 2021

Fichier:
ruxolitinib-fbp-oncohemato-oncopacacorse-2021.pdf

Date de parution:
Mercredi, septembre 15, 2021