

Information aux usagers : Le DSRC OncoPaca-Corse décline sa responsabilité concernant les contenus publiés sur d'autres sites web prétendant être liés à notre structure ou utilisant sans autorisation, en tout ou partie, nos dénominations, noms de domaine et marques "OncoPaca" et "OncoPaca-Corse".



Pneumologie

PHASE I OPEN-LABEL, DOSE ESCALATION TRIAL OF BI 1831169 MONOTHERAPY AND IN COMBINATION WITH EZABENLIMAB IN PATIENTS WITH ADVANCED OR METASTATIC SOLID TUMORS

PATCH DE CAPSAÏCINE 179 MG VERSUS DULOXÉTINE ORALE CHEZ DES PATIENTS ATTEINTS DE NEUROPATHIE PÉRIPHÉRIQUE INDUITE PAR LA CHIMIOTHÉRAPIE : UNE ÉTUDE OUVERTE MULTICENTRIQUE RANDOMISÉE DE PHASE III

ETUDE PROSPECTIVE INTERNATIONALE POUR ÉVALUER L'IMPACT DE LA BIOPSIE LIQUIDE CHEZ LES PARTICIPANTS AYANT UN DIAGNOSTIC CLINIQUE DE CANCER AVANCÉ (L1ST)

ETUDE MULTICENTRIQUE DE PHASE II EN DEUX PÉRIODES, RANDOMISÉE, EN OUVERT ÉVALUANT LE BÉNÉFICE CLINIQUE D'UN TRAITEMENT DE MAINTENANCE PAR UNE THÉRAPIE CIBLÉE ADAPTÉE AUX ALTÉRATIONS MOLÉCULAIRES IDENTIFIÉES DANS LA TUMEUR POUR DES PATIENTS ATTEINTS DE TOUS TYPES DE TUMEURS SOLIDES LOCALEMENT AVANCÉES OU MÉTASTATIQUES EN PROGRESSION

ETUDE DES TOXICITÉS CHRONIQUES DES TRAITEMENTS ANTICANCÉREUX CHEZ LES MALADES PORTEURS DE CANCER LOCALISÉ

ETUDE PROSPECTIVE MULTICENTRIQUE EN VIE RÉELLE
ÉVALUANT L'IMPACT CLINIQUE ET ORGANISATIONNEL DU
DISPOSITIF MÉDICAL CONNECTÉ DE TÉLÉSURVEILLANCE
MOOVICARE® POU MON DANS LE SUIVI DES PATIENTS
PRÉSENTANT UN CARCINOME BRONCHIQUE

UNE PREMIÈRE ÉTUDE DE PHASE 1 CHEZ L'HOMME ÉVALUANT
L'INNOCUITÉ, LA PHARMACOCINÉTIQUE ET L'EFFICACITÉ DE
L'ABBV-400 CHEZ DES SUJETS ADULTES ATTEINTS DE TUMEURS
SOLIDES AVANCÉES

RÉFÉRENTIEL INCA "PATIENTS ATTEINTS D'UN CANCER
BRONCHIQUE NON À PETITES CELLULES : INDICATIONS DES
TESTS MOLÉCULAIRES EN VUE DE LA PRESCRIPTION DE
TRAITEMENTS DE PRÉCISION"

ETUDE DE PHASE II, VISANT À ÉVALUER L'EFFICACITÉ ET LA
TOLÉRANCE DE THÉRAPIES CIBLÉES ET D'UNE
IMMUNOTHÉRAPIE, POUR DES TUMEURS AGNOSTIQUES
CARACTÉRISÉES PAR PROFILAGE GÉNOMIQUE LARGE

ETUDE DE PREMIÈRE ADMINISTRATION À L'HOMME DE L'ANTI-
CD73, IPH5301 SEUL OU EN COMBINAISON AVEC LA
CHIMIOTHÉRAPIE ET LE TRASTUZUMAB CHEZ DES PATIENTS
AYANT DES TUMEURS SOLIDES AVANCÉES